Domowe preparaty ogrodnicze — przepisy i proporcje

Gotowa ściąga do warzywnika: proporcje, czas przygotowania, rozcieńczenie i uczciwa ocena, na co dany preparat działa, a na co nie. Domowe wyciągi nie są zarejestrowanymi środkami ochrony roślin.

Gnojówka z pokrzywy (nawóz azotowy)

- Proporcja: ok. 1 kg świeżego ziela (lub 100–200 g suszu) na 10 l wody.
- Czas: fermentacja 10–20 dni, mieszać codziennie; gotowa, gdy przestaje się pienić.
- Rozcieńczenie: 1:10 do podlewania, 1:20 dla młodych roślin i dolistnie.
- Działa jako nawóz i na kondycję roślin; nie jest środkiem owadobójczym.

Wyciąg z pokrzywy (macerat)

- Proporcja jak wyżej, ale moczenie tylko 12–24 godziny, bez fermentacji.
- Używać świeżego; bywa stosowany do wspomagania roślin i oprysków.

Wywar / wyciąg ze skrzypu polnego

- Skrzyp gotować ok. 20–30 minut lub zaparzyć, ostudzić, rozcieńczyć (ok. 1:5).
- Zawiera krzemionkę; wspiera odporność na choroby grzybowe — profilaktycznie, nie leczy.

Mydło szare (na mszyce i inne miękkie owady)

- Kilka łyżek szarego mydła rozpuścić w ciepłej wodzie (ok. 1 l), ostudzić.
- Opryskiwać dokładnie, także spód liści; nie w pełnym słońcu i nie na kwitnące rośliny z pszczołami.
- To realnie działający domowy środek na mszyce — skuteczniejszy niż sama gnojówka.

Częste błędy

Zbyt stężony roztwór (ryzyko poparzenia i przenawożenia, zwłaszcza młodych roślin), stosowanie w pełnym słońcu oraz opryskiwanie roślin w pełni kwitnienia, gdy odwiedzają je zapylacze. W uprawach towarowych obowiązują przepisy o środkach ochrony roślin.

Materiał redakcji Aura Natury — do wydruku i użytku własnego. Pełny artykuł źródłowy:
https://au.poznan.pl/gnojowka-z-pokrzywy/