Szara pleśń — lista zapobiegania: truskawki i pomidory

Szarej pleśni nie zwalcza się jednym opryskiem — wygrywa się z nią warunkami uprawy. Ta lista przekłada wiedzę o chorobie na konkretne czynności przed sezonem, w trakcie i po zbiorze.

Przed sezonem

- Usuń zeszłoroczne resztki roślinne — na nich zimują przetrwalniki grzyba.
- Zaplanuj większą rozstawę, by rośliny szybciej obsychały.
- Truskawki: przygotuj ściółkę (słoma, mata), żeby owoce nie leżały na wilgotnej ziemi.

W trakcie uprawy

- Podlewaj pod korzeń i rano; unikaj zraszania liści wieczorem.
- Wietrz tunele i szklarnie, obniżaj wilgotność powietrza.
- Usuwaj przekwitłe kwiaty, dolne zacienione liście i pierwsze porażone owoce.
- Nie przenawożaj azotem — bujny, miękki wzrost choruje łatwiej.
- Zbieraj dojrzałe owoce na bieżąco, nie pozwól im przejrzewać.

Po zbiorze

- Nie pakuj owoców mokrych ani uszkodzonych — jeden chory zaraża całą skrzynkę.
- Schładzaj plon szybko i przechowuj w niskiej temperaturze.
- Porażone owoce usuwaj i niszcz, nie kompostuj.

O fungicydach

Jeśli zabieg jest konieczny, stosuj wyłącznie środki dopuszczone w danej uprawie (rejestr MRiRW, etykieta) i nie powtarzaj tego samego preparatu — Botrytis szybko uodparnia się na substancje o jednym mechanizmie działania. Zabieg bez poprawy warunków uprawy zwykle nie wystarcza.

Materiał redakcji Aura Natury — do wydruku i użytku własnego. Pełny artykuł źródłowy:
https://au.poznan.pl/szara-plesn/